

Enjoy
Gardening Life

アサヒペン

低臭タイプ

木目を生かすナチュラル仕上げ

水性 ガーデン用カラー

木部用 防虫 防腐 防カビ 防藻 撥水 スティン



注意書きをよく読んでから使用して下さい。



用途 ラティス・ウッドデッキ・トレリスなどガーデン用木製品や外板・板ベイ・破風板など屋外の未塗装木部に

標準塗り面積(2回塗り)
1~1.5㎡ タタミ0.5~0.9枚分
乾燥時間
夏期/約2時間 冬期/約3時間
塗り重ね時間の目安
夏期/1~3時間 冬期/2~4時間

1/5L

商品名 水性ガーデン用カラー **品名** 合成樹脂塗料(水系)

成分 合成樹脂(アクリル・ウレタン)、顔料(クリヤを除く)、防腐剤、防カビ剤、防虫剤、撥水剤、水

特長 ●木目を生かした美しいスティン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。●撥水剤の配合により塗装直後から長期間撥水性を維持し、木部を保護します。

用途 ●ラティストレリス・プランター・ウッドデッキなどガーデン木製品。●家具・窓枠・堀木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品。
※ 常時水のかかるところや浸かるところ、いつも湿っているところ、また屋内の床面、ベットのなめたりするようなところには適しません

塗装方法 ①塗る面のゴミ・油分・よごれ・旧塗膜を取り除き、木部の水分を乾燥させます。塗る面全体を木目に沿って#240程度のサンドペーパーできれいにします。ヤニはラッカーうすめ液で十分拭き取ります。②フタを開ける前に、容器をよく振り塗料をよく混ぜます。容器のフタに手をそえて、フタと容器の間にマイナスドライバーを差し込んで開け、棒などで塗料を底から十分にかき混ぜて均一にします。③うすめずに、ウッドケア用ハケを使用して木目に沿ってたっぷりと吸い込ませるように塗り、塗り重ね時間の目安に従って、さらにもう1回塗り重ねて仕上げます。2回目は塗装条件により、塗りムラ・ハジキが生じることがありますが、この場合はハケ返しを何度か行って均一に仕上げます。(2回塗りすると色が濃くなり、わずかにツヤが出てきます)④塗装後、塗装表面にざらつきが生じた場合、サンドペーパー(#320)を軽く当ててから塗り重ねると、滑らかに仕上がります。

用具の手入れ方法 使用した用具は乾かないうちに、新聞紙かボロ布でできるだけ塗料を拭き取り、水か湯で洗って下さい。

保管上の注意 ①幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲、誤食、いたずらをしないよう注意して下さい。②残った塗料は、フタをし、直射日光や-5℃以下の場所を避けて保存して下さい。

株式会社アサヒペン 大阪市鶴見区鶴見4-1-12 <http://www.asahipen.jp> 日本製
お客様相談室 東京03-3846-9545・大阪06-6934-0300 01-1105

取扱い上の注意 ①表示の用途以外に使用しないで下さい。塗料がすでに塗装されている素材や、吸い込みがない化粧合板には塗れません。食器など直接食べ物と接触するところには塗らないで下さい。②目に入ったり、皮膚に付着しないよう、また誤飲しないように注意して下さい。③塗装中、乾燥中とも換気をよくして下さい。④塗料がついても支障がない服装で作業をして下さい。⑤天気がよく、湿度の低い日に塗って下さい。また、塗装中、乾燥中とも5℃以下になるときは塗らないで下さい。⑥塗り重ねの間隔が長くなったり、降雨後に塗り重ねると、塗る素材によっては塗料がハジク場合があります。この時は#600程度のサンドペーパーで表面を軽く研磨してから塗って下さい。⑦均一になった塗料の見かけの色は、エマルジョン樹脂の影響で表示の色と異なって見えることがありますが、表示の色は2回塗りした乾燥後の色です。⑧下地の色や吸い込みの割合によって仕上がりの状態や色、乾燥性が大きく左右されますので、あらかじめ目立たない部分で試し塗りをして、色・浸透性・下地への影響などを確かめてから塗って下さい。⑨塗り面積・乾燥時間・着色力・色相などは、素材・塗り方・気象条件等により多少異なります。⑩表示の色は印刷のため、実際の色と多少異なります。⑪容器は塗料を使いきってから捨てて下さい。⑫やむをえず塗料を捨てるときは、水性塗料用固化剤で固化するか新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。

危険		●遺伝性疾患のおそれ ●臓器の障害
		●水生生物に非常に強い毒性

救急処置 ●目に入ったときは、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。●誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。●蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。●皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化のあるときは、医師の診察を受けて下さい。