

確かな効果はそのままに、
わずか水**5ℓ/10a**の
少水量散布を実現！

ラウンドアップ®
マックスロード



ラウンドアップ®マックスロード
農林水産省登録 第21766号
有効成分 グリホサートカリウム塩 48.0%

ラウンドノズル®ULV5は、10アールあたり
[薬量**500mℓ**/水**5ℓ**~]が基本です。

基本 希釈水量**5ℓ~**/10a
薬量**500mℓ***/10a

作物名、適用場所等により異なります。薬量200~1,000mℓ/10a
*ご使用前に除草剤ラウンドアップ®マックスロード製品ラベルをご確認ください。

希釈水量**5ℓ~**/10aの登録抜粋 2018年12月現在 ※少量散布(5ℓ~/10a)は専用のラウンドノズルULV5を用いて散布してください。

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10アール当り使用量		本剤の 使用回数	使用方法	グリホサートを含む 農薬の総使用回数
				薬量 (mℓ)	希釈水量 (ℓ)			
水田作物 (水田畦畔)	水田畦畔	一年生及び 多年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期)	200～ 500	少量散布 5～25	3回 以内	雑草茎葉 散布	3回 以内
		一年生雑草及び 多年生広葉雑草		500～ 1000				
水田作物、 畑作物 (休耕田)	休耕田	一年生雑草	雑草生育期	200～ 500	通常散布 50～100	2回 以内		2回 以内
		多年生雑草		500～ 1000	少量散布 5～50			
水田作物 (水稻を除く) 移植水稻	――	一年生雑草及び 多年生広葉雑草	耕起前 (雑草生育期)	200～ 500	通常散布 50～100 少量散布 5～50	3回 以内		3回 以内
		多年生イネ科雑草		500	少量散布 5～25			
直播水稻		一年生雑草及び 多年生広葉雑草		200～ 500	通常散布 50～100 少量散布 5～50			
		多年生イネ科雑草		500				
麦類	圃場内の 周縁部	一年生雑草	耕起前又は は種前まで (雑草生育期)	200～ 500	少量散布 5～25	2回 以内		4回 以内
			は種後出芽前 (雑草生育期)		通常散布 50～100 少量散布 5～50			
			収穫前日まで (雑草生育期)					
だいず	――		耕起前又は 出芽前まで (雑草生育期)	200～ 500	通常散布 50～100 少量散布 5～50	3回 以内	3回 以内	
えだまめ								
樹木等	公園、堤とう、 駐車場、道路、 運動場、宅地、 のり面、鉄道 等	一年生及び 多年生雑草	雑草生育期	500～ 1000	少量散布 5～25	3回 以内	植栽地を 除く樹木等 の周辺地に 雑草木茎葉 散布	3回 以内

