

特 長

野菜果樹花樹木

さまざまな植物の
病気と虫に効く

殺虫成分 **ジノテフラン** は

葉に吸収 され葉裏の
隠れた **害虫** にも **効く**

殺菌成分 **ペンチオピラド** は

病気に
予防 治療
Wで効く

適用病害虫の一例



アブラムシ



ウリハムシ



コナジラミ



カメムシ



ケムシ



コナカイガラムシ



うどんこ病




さび病



黒星病



近くに
広く噴射
できます。



離れた所
まで噴射
できます。

使用後は、必ず
「OFF」に戻して
ください。

適用病害虫の範囲及び使用方法

【使用方法】希釈せずそのまま散布する。【希釈倍数】原液

作物名	適用病害虫名	使用時期	本剤の 使用回数	ジノテフランを含む農薬の総使用回数	ペンチオピラドを含む 農薬の総使用回数
トマト ミニトマト	コナジラミ類、葉かび病	収穫前日まで	2回以内	5回以内 (培土混和及び灌注は合計1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)	3回以内
なす	アブラムシ類、コナジラミ類、うどんこ病	収穫前日まで	2回以内	3回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)	3回以内
ピーマン	アブラムシ類、うどんこ病	収穫前日まで	2回以内	3回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)	3回以内
きゅうり	アブラムシ類、コナジラミ類、ウリハムシ、うどんこ病	収穫前日まで	2回以内	4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)	3回以内
ねぎ	アザミウマ類、さび病	収穫3日前まで	2回以内	4回以内 (は種時の土壌混和、育苗トレイへの灌注及び定植時の株元散布は合計1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)	4回以内 (株元灌注は2回以内、散布は2回以内)
ブロッコリー	アブラムシ類	収穫3日前まで	2回以内	3回以内 (定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布は2回以内)	3回以内
オクラ	アブラムシ類	収穫前日まで	2回以内	3回以内 (株元散布は1回以内、散布は2回以内)	3回以内
キャベツ	アブラムシ類	収穫3日前まで	2回以内	3回以内 (育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布は2回以内)	3回以内
はくさい	アブラムシ類	収穫3日前まで	2回以内	3回以内 (定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布は2回以内)	3回以内
レタス 非結球レタス	アブラムシ類	収穫3日前まで	2回以内	4回以内 (は種前の培土混和は1回以内、育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)	3回以内
豆類(未成熟、ただし、 さやいんげん、 さやえんどう、実えんどう 及び未成熟ささがを除く)	アブラムシ類	収穫7日前まで	2回以内	2回以内	3回以内