

コリン含有葉面散布肥料

根っこりん

肥料登録番号：生第93232号

根茎菜類の地下部の肥大促進に効果的です。

特長

- ・地下部の肥大促進に効果が認められている**コリンを含有**しています。
- ・根茎菜類（その他玉ねぎ、アスパラガス等）の**収量増加**に効果的です。
- ・塊根への光合成産物蓄積を促進する作用があります。

使い方

- ・250倍にうすめて葉面散布してください。
- ・肥大初期（目安：収穫の約1ヶ月～1ヶ月半前）から肥大期間中に、7～10日おきをめどに2回葉面散布してください。
※肥大効果の面から、収穫2週間前を最終散布日の目安としてください。
- ・アスパラガスについては、黄化期間（刈り取り前の約1ヶ月～1ヶ月半）にご使用ください。

肥大効果が確認
されています！

ダイコン・タマネギ・バレイショ・ニンジン・ゴボウ・カブ
カンショ・ナガイモ・ショウガ・アスパラガス・ビート
コンニャクイモ・ラッキョウ・ニンニクなど

※アスパラガスは貯蔵根の重量増加（春芽の増収）

成分
（％）

窒素全量

1.5

水溶性りん酸

5.0

水溶性加里

3.0



株式
会社

生科研

〒861-2401 熊本県阿蘇郡西原村鳥子312-4

0120-376-831

【受付時間】 平日9:00～17:00 <https://www.n-seikaken.co.jp>



NEK-07S

根っこりん

「根っこりん」散布による肥大効果事例

作物：バレイショ




L・2Lの比率がアップしました！

試験地：長崎県
処理方法：根っこりん 2回散布
調査日：2013.6.11

無処理区 根っこりん区

作物：ニンジン




肥大促進で階級アップ

無処理区 根っこりん区

試験地：熊本県
処理方法：根っこりん 2回散布
調査日：2012.12.19


階級調査結果

調査数：各区20株



階級調査結果

調査数：各区100本



商品案内

コリン含有葉面散布肥料

根っこりん

剤型：液体（無色透明）



包装：2 kg 20 kg

「コリン」とは

- ・ビタミンB複合体の1つに分類される水溶性ビタミンの1つです。
- ・広く動植物内に含まれる成分です。
- ・光合成産物を塊根等の蓄積部位へ移動させる作用があります。

根っこりんの商品紹介、
効果事例はこちらでも
ご確認いただけます!!



注意

- ・石灰硫黄合剤と混合すると有毒ガスが発生する恐れがあり、危険ですから混用は行わないこと。
- ・目に入らぬように注意し、もし目に入った場合はすぐに水で十分に洗い流してください。
- ・高温で日照の強い時など、不適と考えられる条件での散布は、避けてください。早朝もしくは夕刻の涼しい時に散布してください。
- ・高温で散布後の液剤が乾燥しにくい時や樹勢の弱い圃場では、散布をひかえてください。
- ・塊根への光合成産物蓄積を促進する作用により、地上部の黄化を伴う場合がありますが、問題ありません。
- ・うすめた液はその日のうちに使い切ってください。
- ・直射日光を避け涼しい所に保管してください。
- ・沈殿物や結晶を生じることがありますので、よく振ってお使いください。
- ・詳しい使い方については、JAまたは農業技術指導機関にご相談ください。