

レンテミン液剤 160ML 殺菌剤 植物成長調整剤

シイタケ菌糸体抽出物液剤

トマト・ピーマン・きゅうり・メロン・すいか

シンビジウム・稲・芝生・花木類（つつじ類、つばき類）



※本剤およびシイタケ菌糸体抽出物を含む農薬の副使用回数

作物名	使用目的	希釈倍数	使用液量	使用時期	使用方法
トマト ミニトマト ピーマン とうがらし類 すいか メロン	モザイク病 感染防止	10倍	10a当り100ℓ	収穫前日まで	移植及び各作業 (摘芽、誘引等) の直前に散布
ピーマン とうがらし類 すいか メロン		原液	—	管理作業時	手指、器機を薬液に浸漬し 濡れた状態で使用
たばこ		5~10倍	育苗箱当たり500ml	移植前	散布
シンビジウム	根部分生促進	原液~3倍	—	株分け時	株の10分間浸漬
きゅうり		原液	—	管理作業時	手指、器機を薬液に浸漬し 濡れた状態で使用
稲	根部分生促進	1000倍	—	催芽前	48時間種子浸漬
稲(育苗箱)		500倍	育苗箱(30×60× 3cm)使用土量約5ℓ 1箱当たり500ml	出芽前時~ 移植5日前	灌注
日本き(こうりいば) 西洋き(ベントグラス)	根部分生促進	500倍	10a当り 500~1000ℓ	春期~ 夏期芝生時期	茎葉散布
つつじ類 つばき類	発根促進	10~20倍	—	挿し木時	さし木基部3時間浸漬

- ・シンビジウム・各種野菜のモザイク病伝染防止に
- ・つつじ・つばき類の発根促進
- ・稲・芝の根部生育促進剤として使用可能
- ・手指、器機（ハサミ）の消毒

JAN 4975730467323 入数 60 上代 2200

商品サイズ 幅 56 高さ 140 奥行 56 (mm)

有機農作物に使用できます (JAS法認定)

農林水産省登録 第17774号