

# Presto XG<sup>®</sup> / Presto<sup>®</sup>

(プレストXG) (プレスト)

	Presto XG	Presto
pH 値 (原液)	11 (アルカリ性) ※希釈後の値は、使用する水のpHによって変化します。	6 (弱酸性) ※希釈後の値は、使用する水のpHによって変化します。
規格	500mℓ、10ℓ 10ℓはノズル付属	500mℓ、2.3ℓ、10ℓ 2.3ℓ、10ℓはノズル付属
散布時期・使い方	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 散布時期：育苗期や定植直前の苗、本圃での定期的な散布をおすすめします。</li> <li>● 使い方：7～10日間隔での散布をおすすめします。</li> <li>● より効果を出すためには、展着剤との併用（混用）をおすすめします。</li> </ul>	
使用にあたって	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 保管条件によって色が濃くなる場合がありますが品質上、問題ありません。</li> <li>● 沈殿物が生じる場合がありますが品質上、問題ありません。（よく振ってからご使用ください。）</li> <li>● 他の農薬や肥料との併用（混用）は、反応により効果が期待できなくなる恐れがあります。</li> <li>● 希釈液は必ず製造当日にお使いください。</li> <li>● 初めての使用の際は、少量でお試しく下さい。万が一障害等が見られたときは、使用を中止してください。</li> <li>● 高温時の散布や希釈倍率が低い散布の場合、感受性の強い作物によっては、軽いちぢれ等の障害を引き起こす場合がありますので、少量でお試しく下さい。</li> <li>● 水耕栽培や土壌への灌注は、根部に障害を引き起こす場合がありますので施用は避けください。</li> </ul> <p>【PrestoXG】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用器具は、使用后すぐに微温湯または水を流しながらぬるぬるする感じがなくなるまで洗い流してください。目詰まりの原因となります。</li> <li>● 強酸性水での希釈は効果が期待できません。</li> </ul>	
有効期限	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 通常肥料のため有効期限はありません。</li> </ul> <p>※肥料の腐敗を抑えるために銀イオンを使用しています。</p>	
保管	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 密封して空気との接触を避け、直射日光の当たらない冷暗所で保管してください。</li> </ul> <p>【PrestoXG】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 開封状態が続いた場合、固まる場合があります。</li> </ul>	
注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本品は飲料ではありません。</li> <li>● 本製品の分解・改造はおやめください。</li> <li>● 幼児や子供の手の届かない所に保管してください。</li> <li>● 農作物への散布以外の使用はおやめください。</li> </ul> <p>【PrestoXG】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 万が一皮膚に刺激を感じた場合は、石けんを使用せず、微温湯または水を流しながら刺激や「ぬるぬる感」がなくなるまで洗い続けてください。</li> <li>● 異常があれば医師の手当てを受けてください。（本製品はアルカリ性です）</li> </ul>	

■販売店

■製造元



抗菌化研株式会社  
Antimicrobial Technology Co.,Ltd.

TEL: 075-748-8191 FAX: 075-748-8290  
京都市南区上鳥羽西浦町54番地