

芝用殺菌剤

農林水産省登録
第24844号

トップグ래스®

顆粒水和剤

世界が認めた **チオファネートメチル** 70.0%含有

呼吸障害

(チオファネートメチル)

&

微小管形成障害

(MBC-分解物)

ダブルの作用で

- ① ワイドスペクトラム
- ② 予防と治療のダブル効果
- ③ 優れた浸透性



Topgrass

販売元



株式会社ニッソーグリーン

東京都台東区上野3丁目1番2号

☎03-5816-4351 <http://www.ns-green.com/>

包装:1Kg×10袋

- 主要病害を広範囲に同時防除可能
- ベントグラス・日本芝に高い安全性
- 使いやすいドライフロアブル製剤

- 1.発生時期の早めの散布により病害の発生をよりの確に防ぎ、病害多発シーズンを乗り越えることができます。
- 2.連用はさけて、殺菌剤のローテーションの一剤として使用してください。
- 3.予防処理の基本は、1,000倍の0.5ℓ/m²処理、発病後の処理は、500倍の0.5ℓ/m²処理。

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用時期	本剤の使用回数	チオファネー トメチルを 含む農薬の 総使用回数	使用方法
西洋芝 (ベントグラス)	疑似葉腐病(イエローパッチ)	1,000	秋～春期	8回以内	8回以内	1 m ² 当たり 0.5 ℓ 散布
	葉腐病(ブラウンパッチ)		発病初期			
	ダースポット病	500～1,000				
	炭疽病	500				
	立枯病(テイクオールパッチ)	1,500				
カーブラリア葉枯病						
ヘルミントスポリウム葉枯病						
日本芝	葉腐病(ラージパッチ)	1,000				
	疑似葉腐病(象の足跡)					
	疑似葉腐病(春はげ症)		休眠期前	1 m ² 当たり 0.5 ℓ 散布		

