

防 食 防 ス ケ ー ル 剤

メ イ ト ー ガ ー ド S - 8 0 2

使用前に使用方法及び取扱い上の注意事項をよく読んで正しくお使い下さい。

●用途

◇循環冷却水回路の防食防スケール

●特長

◇ポリカルボン酸系特殊高分子化合物と有機インヒビターの作用により銅・銅合金の防食とハードスケールの防止が一剤で可能となりました。

●性状

◇アルカリ性・淡黄色透明液体

●標準使用量

◇初期添加量 : 120～200mg/ℓ (全保有水量に対して)

◇補充添加量 : 60～120mg/ℓ (補給水量に対して)

※補給水量に対して補充添加致しますので循環水中の維持濃度は濃縮倍数により異なります。

※3倍濃縮未満の低濃縮運転時に置きましたは循環水中に最低維持濃度(180mg/ℓ)以上となる様に補充添加量を設定して下さい。

●使用方法

◇初期添加量を冷却塔に添加して下さい。

◇補充添加量を薬液注入装置により冷却塔又は冷却水配管に注入添加して下さい。

※薬剤は希釈しないで原液で御使用下さい。

※補充添加用の薬液注入装置は補給水流量比例作動・冷却水循環ポンプ連動作動・タイマー作動の中から使用回路条件及び運転条件に適合したシステムを選定して御使用下さい。

※薬剤には紫外線により発色する成分が含まれておりますので薬剤及び薬剤使用の循環冷却水が淡黄色又は淡褐色に着色する場合がありますが性能等には全く影響有りません。

●取扱い上の注意事項

◆使用上の注意

◇用途以外には絶対に使用しないで下さい。

◇アルカリ性薬剤の為刺激性が有り炎症を起す事がありますので保護手袋・保護メガネを着用し皮膚に付着しない様に又目や口に入らない様に注意して取り扱って下さい。

◇万一誤って飲み込んだ場合には直ちに口をすすいで下さい。無理に吐かせないでください。目に入った場合及び皮膚に付着した場合には直ちに多量の水で洗い流して下さい。応急処置後アルカリ性薬剤によるものと告げて医師の診察を受けて下さい。

◇衣服に付着した場合には直ちに多量の水で洗い流して下さい。

◇他の薬剤との混合は一切行わないで下さい。

◆保管上の注意

◇薬剤の残留している容器はキャップを確実に閉めて保管して下さい。

◇幼児の手の届く所に置かないで下さい。

◇直射日光の当たる場所や高温となる場所に置かないで下さい。

◆廃棄上の注意

◇廃棄においては関連法案、規則並びに地方自治体の基準に従って下さい。

◇内容物または容器を廃棄する場合は、都道府県知事等の許可を受けた産業廃棄物処理業者もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して下さい。

◆その他の注意

◇容器が破損しない様注意して取り扱って下さい。

◇周囲に飛び散ったり漏出した場合には直ちに拭き取って下さい。

◇使用後の容器を飲用等に使用しないで下さい。

名東ケイエスジエリック株式会社

名古屋市中区錦一丁目13番19号

ア ト ロ ン N 缶

1 0 K g 入 り