

殺虫剤
フルベンジアミド水和剤

ロックオン[®]

農林水産省登録 第24033号

(日本農薬(株)登録)

性状：類白色水和性粘稠懸濁液体

毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものをいう通称）

危険物：非該当

有効年限：4年

包装：500ml × 4 (熊本、宮崎、鹿児島)

100ml × 10 (全国)

有効成分：フルベンジアミド（化管法第1種）···5.0%

殺虫剤分類

28

ロックオン[®]は日本農薬(株)の登録商標です。

特長

- チョウ目害虫に特異的に作用するベンゼンジカルボキサミド系殺虫剤です。
- 樹木のケムシ類害虫に対して、摂食活動を停止させる効果があります。
- 散布後約3ヶ月の効果が持続が期待できます。（※気象条件や害虫の発生密度で効果持続期間は変動します）
- 速やかに摂食行動を阻害し、高い食害抑制効果を示します。
- 耐雨水性に優れ効果持続性があり、長期間安定した効果を示します。
- 幼虫の発育令にかかわらず高い効果を示します。
- 選択性が高く、カイコを除く有用昆虫や哺乳類に高い安全性があります。
- いぬまきの害虫であるキオビエダシャク（シャクガ科）に対してご使用いただけます。

適用病害虫名及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	10アール 当たり 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	フルベンジアミドを 含む農薬の 総使用回数
樹木類 (いぬまき、 さくらを除く)	ケムシ類	1000倍	200～ 700ℓ	発生初期	2回以内	散布	2回以内
いぬまき	ケムシ類 キオビエダシャク	1000倍	200～ 700ℓ	発生初期	2回以内	散布	2回以内
さくら	ケムシ類 イラガ類	1000倍	200～ 700ℓ	発生初期	2回以内	散布	2回以内

使用上の注意事項

- カイコに対して影響があるので、カイコのエサとなる桑葉にはからないようにしてください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

安全使用上の注意事項

- 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に關係のない者が散布区域に立ち入らないよう繩囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

水産動植物に係る注意事項

- 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使い切ってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。
また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

保管に関する注意事項

- 直射日光を避け、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。