

作物名、適用場所および使用量

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量/10アール当たり		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数			
				薬量 (mL)	希釈水量 (L)						
果樹類 (かんきつを除く)	-	一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	250~500	通常散布50~100	3回以内	-	3回以内			
		多年生雑草		500~1000							
かんきつ	-	マルバツユクサ	-	1000~2000	100	3回以内	-	5回以内			
		スズメ		2000							
		一年生雑草		250~500							
		多年生雑草		500~1000							
水田作物、畑作物 (休耕田)	休耕田	一年生雑草	雑草生育期	250~500	-	2回以内	-	3回以内			
		多年生雑草		500~1000							
水田作物 (水田畦畔)	水田畦畔	一年生雑草	収穫14日前まで (雑草生育期)	250~500	50~100	2回以内	-	3回以内			
		多年生雑草	500~1000								
水田作物 (水田刈跡)	水田刈跡	一年生雑草	雑草生育期	250~500	50~100	1回	-	1回			
		多年生雑草	500~1000								
水田作物 (水稲を除く)	-	一年生雑草	耕起20~10日前まで (雑草生育期)	250~500	-	1回	-	2回以内			
移植水稲											
直播水稲											
麦類 (小麦を除く)									は種30日前~出芽前 (雑草生育期) (乾田耕起栽培)	50	2回以内
小麦									500~750	50~100	3回以内
雑穀類	多年生雑草	50~100	3回以内								
野菜類 <small>(だいこん、えだまめ、豆類(雑菜、たさい、らつかせいを除く)、いちじく、なす、たけのこ、トマト、きゅうり、なす、アスパラガス、オリーブ(葉)、たらきのき、びわ(葉)、ほうれんそう、レタス、とうがらし類、にんじん、ピーマン、薬用(にんじんを除く))</small>	-	一年生雑草	耕起7日前まで (雑草生育期)	250~500	100	1回	-	2回以内			
とうがらし類、にんじん、ピーマン、だいこん											
アスパラガス、オリーブ(葉)、たらきのき、びわ(葉)、ほうれんそう、レタス、トマト、きゅうり、なす	-	一年生雑草	-	250~500	100	1回	-	3回以内			
しゃくやく(薬用)											
薬用(にんじん)	-	一年生雑草	-	250~500	100	1回	-	3回以内			
ねぎ											
			収穫14日前まで (雑草生育期、定植後畦間処理)	50~100	50~100	3回以内		3回以内			

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量/10アール当たり		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量 (mL)	希釈水量 (L)			
たまねぎ	-	一年生雑草	耕起7日前まで (雑草生育期)	250~500	少量散布25~50	3回以内	-	3回以内
			耕起又は定植7日前まで (雑草生育期)					
えだまめ	-	一年生雑草	耕起7日前まで (雑草生育期)	250~500	少量散布25~50	2回以内	-	2回以内
豆類 <small>(雑菜、たさい、だいず、らつかせいを除く)</small>			は種後出芽前 (雑草生育期)					
だいず	-	一年生雑草	耕起前又はは種前まで (雑草生育期)	250~500	少量散布25~50	2回以内	-	4回以内
かんしよ			は種10日以前 (雑草生育期)					
いも類 (かんしよを除く)	-	一年生雑草	は種後出芽前まで (雑草生育期)	250~500	少量散布25~50	1回	-	2回以内
茶			耕起前 (雑草生育期)					
さとうきび	圃場内の周縁部	多年生雑草	収穫30日前まで (雑草生育期)	500~1000	少量散布25~50	1回	雑草茎葉散布	2回以内
飼料用とうもろこし	-	一年生及び多年生雑草	耕起前又はは種前まで (雑草生育期)	250~500	50~100	2回以内	-	2回以内
牧草	牧野、草地 (更新・造成)	一年生雑草	更新・造成の10日以前 (雑草生育期)	500~1000	50	2回以内	-	3回以内
		多年生雑草						
樹木類	造林地 (地ごしらえ)	一年生及び多年生雑草	は種後出芽前まで (雑草生育期)	250~500	50~100	1回	雑草茎葉散布	1回
		ススキ、ササ類等の多年生雑草、落葉雑草かん木	耕起(整地)後 (雑草発生前期)	250~500	50~100	4回以内	雑草茎葉散布	4回以内
樹木等	公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等	一年生雑草	生育盛期以降 (夏~秋期)	250~500	50~100	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
		多年生雑草	雑草生育期	500	100	1回	雑草茎葉散布	3回以内
		スギナ	雑草生育期	1000	100	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内

注入処理

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	希釈倍数	使用液量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
					つる径 (cm)	使用量 (mL/株)			
林木	林地	クズ・フジ等のつる類	生育初期	原液又は2倍液	2cm以下	0.5mL/株	1回	つる注入処理	1回
					2.1~3.0cm	1.0mL/株			
		3.1~4.0cm	1.5mL/株						
		4.1~5.0cm	2.0mL/株						
					5.1cm以上	適宜増量			
					1mL/力所				
		落葉雑草かん木	生育期 (5~10月)	原液	樹径 (cm)	力所数		立木注入処理	
	10cm以下				2~3				
					10~20cm	4~8			
					20cm以上	10			
	林地 放置竹林	竹類	夏期	原液	5~10mL/本			竹桿注入処理	